



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Copacabana**

Med.Vet. Solicitante: -

Id. Interna: **262396**

Paciente: **Lucky**

Id. Externa: **47751**

Espécie: **Canina**

Raça: **Poodle**

Sexo: **M**

Idade: **14 anos**

Responsável: **Talita Gomes dos Santos**

Análise macroscópica:

A – Formação cutânea elipsoide, medindo aproximadamente **2,2 × 1,6 × 0,8 cm**, parcialmente revestida por pele. Ao centro observa-se nódulo elevado com área focal de ulceração. À superfície de corte identifica-se lesão sólida, branco-amarelada, bem delimitada. Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

B – Fragmento de pele medindo aproximadamente **1,5 × 1,0 × 0,6 cm**. À superfície de corte observa-se formação cística bem delimitada, preenchida por material queratinoso branco-amarelado. Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

Análise microscópica:

A – Os cortes histológicos evidenciam neoplasia epitelial benigna de diferenciação sebácea, bem delimitada e expansiva, composta por lóbulos de sebócitos maduros entremeados por população periférica de células basaloides germinativas. A epiderme suprajacente encontra-se focalmente ulcerada, associada a infiltrado inflamatório misto moderado e discreto tecido de granulação superficial. Não são observadas atipias citológicas significativas ou figuras de mitose.

As margens histológicas encontram-se livres da neoplasia.

B – Os cortes histológicos evidenciam lesão cística revestida por epitélio escamoso estratificado semelhante ao infundíbulo folicular, contendo abundante queratina lamelar em seu lúmen. Não há evidências de atipia citológica ou proliferação infiltrativa.

As margens histológicas encontram-se livres da lesão.

Conclusão histomorfológica:

A – Adenoma sebáceo ulcerado.

B – Cisto folicular infundibular.

Comentário:

Nota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmpatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2026.



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Copacabana**

Med.Vet. Solicitante: -

Id. Interna: **262396**

Paciente: **Lucky**

Id. Externa: **47751**

Espécie: **Canina**

Raça: **Poodle**

Sexo: **M**

Idade: **14 anos**

Responsável: **Talita Gomes dos Santos**

Ambas as lesões apresentam comportamento biológico benigno. O adenoma sebáceo corresponde a uma proliferação benigna das glândulas sebáceas, sendo frequentemente curativo após excisão cirúrgica completa. A ulceração observada encontra-se relacionada à inflamação secundária da superfície da lesão.

O cisto folicular infundibular representa uma alteração benigna decorrente da dilatação cística do infundíbulo folicular, sem potencial metastático ou comportamento infiltrativo. A recorrência de ambas as lesões é incomum quando completamente removidas.

Referências:

MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

GOLDSCHMIDT, M. H.; HENDRICK, M. J. Tumors of the Skin and Soft Tissues. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

Nota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmpatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2026.