



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Flamengo**

Med.Vet. Solicitante: -

Id. Interna: **262608**

Paciente: **Gisa**

Id. Externa: **48642**

Espécie: **Felina**

Raça: **PCB**

Sexo: **F**

Idade: -

Responsável: **Rosilene Batista**

Análise macroscópica:

Recebidos múltiplos fragmentos irregulares de tecido provenientes de **região auricular**, o maior medindo aproximadamente **4,0 × 2,7 × 2,3 cm**, de superfície irregular e multinodular, coloração pardo-acinzentada e consistência firme. Aos cortes, observam-se áreas nodulares, sólido-císticas, de coloração branco-acinzentada a parda, entremeadas por estruturas cavitárias e tecido de aspecto fibroso. Fragmentos adicionais apresentam características semelhantes. Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

Análise microscópica:

Os cortes histológicos evidenciam proliferação epitelial glandular bem diferenciada, constituída por múltiplas estruturas tubulares, acinares e císticas, revestidas predominantemente por uma a duas camadas de células epiteliais cúbicas a colunares, apresentando diferenciação compatível com **epitélio glandular ceruminoso**. As células apresentam citoplasma moderado, eosinofílico, núcleos arredondados a ovalados e discreta anisocitose e anisocariose.

As estruturas glandulares encontram-se sustentadas por estroma fibrovascular de espessura variável, sem evidências histológicas de invasão destrutiva, pleomorfismo significativo ou demais critérios morfológicos de malignidade.

Associadamente, observa-se **processo inflamatório misto moderado e difuso**, constituído por populações variáveis de células mononucleares e granulócitos, distribuído pelo estroma interglandular e tecidos adjacentes, acompanhado por edema e alterações reativas locais.

Conclusão histomorfológica:

Adenoma de glândula ceruminosa.

Otite/dermatite auricular mista, moderada e difusa.

Comentário:

Os achados são compatíveis com **adenoma de glândula ceruminosa**, neoplasia epitelial benigna originada das glândulas apócrinas modificadas do conduto auditivo externo. A preservação da diferenciação glandular, associada à ausência de critérios histológicos de invasão e de atipia citológica significativa, sustenta o comportamento morfológico benigno.

O processo inflamatório misto concomitante é compatível com alteração inflamatória secundária do tecido auricular e pode estar relacionado à presença da formação, retenção de secreções e/ou alterações inflamatórias preexistentes do conduto auditivo.

Nota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmopatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Flamengo**

Med.Vet. Solicitante: -

Id. Interna: **262608**

Paciente: **Gisa**

Id. Externa: **48642**

Espécie: **Felina**

Raça: **PCB**

Sexo: **F**

Idade: -

Responsável: **Rosilene Batista**

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos, discussão dos achados anatomopatológicos e correlação anatomoclínica, caso necessário.

Referências:

MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

GOLDSCHMIDT, M. H.; GOLDSCHMIDT, K. H. Epithelial and melanocytic tumors of the skin. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Wiley-Blackwell, 2017.

Nota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmpatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.