



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Copacabana**

Med.Vet. Solicitante: **Dr^a. Lia Nunes**

Id. Interna: **262609**

Paciente: **Killa**

Id. Externa: **30234**

Espécie: **Canina**

Raça: **Bull Terrier**

Sexo: **F**

Idade: **10 anos**

Responsável: **Celso César de Albuquerque Maranhão**

Análise macroscópica:

A – Formação cutânea: Recebida formação cutânea exofítica, de contornos irregulares e aspecto multilobulado, medindo aproximadamente **5,5 × 4,5 × 3,0 cm**, recoberta por pele pilosa, de coloração pardo-acinzentada e consistência firme. Aos cortes, apresenta superfície sólida, branco-acinzentada, homogênea, de aspecto fibroso e limites relativamente definidos.

B – Formação cutânea: Recebida formação cutânea de formato ovalado, medindo aproximadamente **3,2 × 1,8 × 1,4 cm**, recoberta por pele, de coloração pardo-acinzentada e consistência firme. Aos cortes, apresenta superfície sólida, homogênea, branco-acinzentada e de aspecto fibroso.

Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

Análise microscópica:

A: Os cortes histológicos evidenciam proliferação dérmica não neoplásica caracterizada por **acentuada deposição e proliferação de fibras colágenas maduras**, organizadas em feixes espessos, densos e irregularmente entrelaçados, promovendo expansão da derme. Os fibroblastos associados são fusiformes, uniformes, bem diferenciados e desprovidos de atipias citológicas significativas. Não são observadas figuras de mitose atípicas, necrose ou padrão infiltrativo destrutivo.

B: Apresenta alterações histomorfológicas semelhantes às descritas em A, com expansão dérmica por **feixes abundantes de colágeno maduro**, associados a pequena população de fibroblastos morfolologicamente uniformes. Não são identificados critérios histológicos de malignidade.

Conclusão histomorfológica:

A: Hamartoma colagenoso.

B: Hamartoma colagenoso.

Comentário:

As duas formações apresentam características compatíveis com **hamartomas colagenosos**, lesões benignas caracterizadas por proliferação/desenvolvimento excessivo e desorganizado de colágeno dérmico maduro, sem evidências de transformação neoplásica maligna.

A ocorrência de **múltiplas formações com a mesma composição histológica** reforça a natureza hamartomatosa do processo. O prognóstico é favorável, e a excisão cirúrgica tende a ser curativa quando completa.

bNota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmopatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.



Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Copacabana**
Med.Vet. Solicitante: **Dr^a. Lia Nunes**
Id. Interna: **262609**

Paciente: **Killa**

Id. Externa: **30234**

Espécie: **Canina**

Raça: **Bull Terrier**

Sexo: **F**

Idade: **10 anos**

Responsável: **Celso César de Albuquerque Maranhão**

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos, discussão dos achados anatomopatológicos e correlação anatomoclínica, caso necessário.

Referências:

GROSS, T. L. et al. *Skin Diseases of the Dog and Cat: Clinical and Histopathologic Diagnosis*. 2. ed. Oxford: Blackwell Science, 2005.

MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

Nota fixa: É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498

vmpatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.