Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Taquara**
Med.Vet. Solicitante**: -**
Id. Interna: **263021**

Paciente: **Skubita** Id. Externa: **1339**
Espécie: **Canina** Raça: **SRD** Sexo: **F** Idade: **12 anos**
Responsável: **Jane Maria dos Santos Lima**

Análise macroscópica:
Foi recebido nódulo proveniente da **pálpebra superior do olho esquerdo**, medindo aproximadamente **1,0 × 0,7 × 0,5 cm**, de formato irregular a ovalado, coloração pardo-acinzentada a pardo-avermelhada e consistência firme. A superfície apresenta área focal irregular compatível com ulceração. Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

Análise microscópica:
Os cortes histológicos evidenciam **proliferação neoplásica benigna de células epiteliais com diferenciação sebácea**, organizada em múltiplos lóbulos, ninhos e cordões. A população é constituída predominantemente por células basaloides de reserva, associadas a focos multifocais de diferenciação sebácea, caracterizados por células maiores, com citoplasma amplo, claro e finamente vacuolizado.

A superfície da formação encontra-se **focalmente ulcerada**, com deposição de fibrina, restos celulares necróticos e infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico, caracterizando **processo supurativo associado**. Observam-se ainda áreas multifocais de hemorragia.

Não são identificados critérios histomorfológicos de malignidade. As margens histológicas encontram-se livres de células neoplásicas.

Conclusão histomorfológica:
Epitelioma sebáceo, focalmente ulcerado e associado a processo inflamatório supurativo e hemorrágico.

Comentário:
Os achados caracterizam **epitelioma sebáceo**, neoplasia benigna constituída predominantemente por células sebáceas de reserva associadas a focos de diferenciação sebácea madura. A ulceração superficial encontra-se acompanhada por inflamação supurativa e hemorragia, interpretadas como alterações secundárias à neoplasia.

Considerando a localização na **pálpebra superior**, é provável que a proliferação tenha origem em **glândula de Meibômio**, que corresponde a uma glândula sebácea modificada da placa tarsal. Na ausência de demonstração histológica inequívoca de continuidade com a estrutura glandular de origem, entretanto, mantém-se na conclusão a classificação morfológica mais conservadora de **epitelioma sebáceo**.

*b**Nota fixa:** É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.*

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498
vmpatologiaveterinaria@gmail.com
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2026.

Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Taquara**
Med.Vet. Solicitante**: -**
Id. Interna: **263021**

Paciente: **Skubita** Id. Externa: **1339**
Espécie: **Canina** Raça: **SRD** Sexo: **F** Idade: **12 anos**
Responsável: **Jane Maria dos Santos Lima**

As margens histológicas encontram-se livres de células neoplásicas, achado favorável ao controle local da formação.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos, discussão dos achados anatomopatológicos e correlação anatomoclínica, caso necessário.

Referências:

GROSS, T. L.; IHRKE, P. J.; WALDER, E. J.; AFFOLTER, V. K. *Skin Diseases of the Dog and Cat: Clinical and Histopathologic Diagnosis*. 2. ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

MEUTEN, D. J. (Ed.). *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

*b**Nota fixa:** É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.*

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498
vmpatologiaveterinaria@gmail.com

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2026.