Resultado Histopatológico

Patologia Veterinária
Por Vanessa Araujo de Moraes

Encaminhado por: **UPA PET Tijuca**
Med.Vet. Solicitante**: -**
Id. Interna: **26336**

Paciente: **Layon** Id. Externa: **43023**
Espécie: **Canina** Raça: **SRD** Sexo: **M** Idade: **12 anos**
Responsável: **Maria Ozeni Silva**

Análise macroscópica:

Recebida formação cutânea nodular, medindo aproximadamente **1,2 × 0,8 × 0,7 cm**, de formato ovalado a discretamente irregular, superfície lisa, intensamente enegrecida e consistência firme. Observa-se pequena faixa periférica de tecido cutâneo e subcutâneo adjacente. Todo o material foi processado para avaliação histopatológica.

Análise microscópica:

Observa-se proliferação neoplásica maligna de células melanocíticas, não encapsulada, predominantemente bem delimitada, porém **focalmente invasiva em direção ao estroma dérmico adjacente**. As células neoplásicas encontram-se organizadas em mantos, ninhos e pequenos agregados, apresentando morfologia predominantemente epitelioide a fusiforme.

As células apresentam citoplasma moderadamente abundante, contendo **quantidade moderada de pigmento melânico intracitoplasmático**, com núcleos arredondados a ovalados e anisocitose e anisocariose discretas a moderadas. A diferenciação melanocítica encontra-se bem preservada.

São observadas **3 figuras de mitose em 10 campos (objetiva 40x/FN22/2,37 mm^2)**. As margens histológicas examinadas encontram-se livres de células neoplásicas.

Conclusão histomorfológica:

Melanoma bem diferenciado, moderadamente melanótico.

Comentário:

Trata-se de neoplasia melanocítica maligna bem diferenciada e moderadamente pigmentada, apresentando **invasão focal dos tecidos adjacentes**. A interpretação do comportamento biológico dos melanomas deve considerar de forma integrada a localização anatômica, características histomorfológicas, atividade proliferativa e estadiamento clínico.

As margens histológicas examinadas encontram-se livres de células neoplásicas. Recomenda-se correlação com a localização anatômica da lesão e avaliação clínica dos linfonodos regionais como parte do estadiamento oncológico.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos, discussão dos achados anatomopatológicos e correlação anatomoclínica, caso necessário.

*b**Nota fixa:** É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.*

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498
vmpatologiaveterinaria@gmail.com
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2026.

Resultado Histopatológico

Encaminhado por: **UPA PET Tijuca**
Med.Vet. Solicitante**: -**
Id. Interna: **26336**

Paciente: **Layon** Id. Externa: **43023**
Espécie: **Canina** Raça: **SRD** Sexo: **M** Idade: **12 anos**
Responsável: **Maria Ozeni Silva**

Referências:

GROSS, T. L.; IHRKE, P. J.; WALDER, E. J.; AFFOLTER, V. K. *Skin Diseases of the Dog and Cat: Clinical and Histopathologic Diagnosis*. 2. ed. Blackwell Science, 2005.

MEUTEN, D. J. *Tumors in Domestic Animals*. 5. ed. Wiley-Blackwell, 2017.

*b**Nota fixa:** É de competência exclusiva do médico veterinário a interpretação dos achados aqui escritos e correlacioná-los aos exames complementares, clínica e histórico do paciente.*

Vanessa Araujo de Moraes
MSc. Médica Veterinária Patologista
CRMV-RJ 13.498
vmpatologiaveterinaria@gmail.com
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2026.