



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Arwon (Arown) 6462**

Tutor: **Jose Henrique**

Solicitante: **Dra. Bruna Mattos**

Protocolo: **106772** Data: **19/02/2026 16:14**

Convênio: **UPA PET (Taquara)**

Idade: **11 anos**

Sexo: **Macho**

Espécie: **CANINA**

Raça: **Shih-Tzu**

Urocultura

Material: **Urina**

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**

Bactéria Isolada: **Enterobacter sp.**

Contagem de Colônias: **1.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Imipenem, Piperacilina-tazobactam.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) **-**

Resistentes: **Cefovecina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Ciprofloxacina, Enrofloxacin, Levofloxacina, Nitrofurantoína, Norfloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Aztreonam, Ertapenem, Meropenem.**

Resistência Intrínseca: **Ampicilina, Amoxicilina, Amoxicilina Ácido clavulânico, Ampicilina-sulbactam, Cefazolina, Cefalotina, Cefalexina, Cefadroxila, Cefoxitina*.**

Observações: *** Não foram definidos pontos de corte clínico para cefoxitina. Espécies de Enterobacterales intrinsecamente resistente a este antimicrobiano produzem β -lactamase AmpC cromossomal induzível (AmpC) que é responsável pelo elevado valor da CIM da cefoxitina quando comparadas com aquelas espécies de Enterobacterales que não produzem esta betalactamase.**

Devido à alta resistência bacteriana aos antimicrobianos testados, foram utilizados antibióticos de uso menos frequente.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 27/02/2026 às 12:19h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.